

PEPTIDEN EN HERSTEL



CJC-1295 en Ipamoreline: Wat het Bewijs Werkelijk Laat Zien

Twee groeihormoonpeptiden die bijna altijd samen worden gestackt. Beide verhogen betrouwbaar uw eigen groeihormoon en IGF-1, en het mechanisme is goed begrepen. De uitkomstgegevens bij mensen zijn nog beperkt, en dat is precies waar toezicht en monitoring tellen.

Swipe

WAT WORDT VERKOCHT

Verkocht als de kortere weg

U heeft CJC-1295 en ipamoreline waarschijnlijk zien verkopen als de kortere weg naar beter herstel, diepere slaap en een slanker lichaam. Hier is het eerlijke deel dat de meeste verkopers overslaan: elk ervan zet uw lichaam werkelijk aan om meer van zijn eigen groeihormoon af te geven, via twee verschillende routes. Maar een hormoon in uw bloed verhogen is niet hetzelfde als veranderen hoe u eruitziet, hoe u zich voelt of hoe u presteert.

TWEE COMPLEMENTAIRE ROUTES

Twee routes, daarom de stack

CJC-1295 bootst het groeihormoon-vrijmakend hormoon na en levert het trage, gestage achtergronddeel van de stack. Ipamoreline activeert de ghrelinereceptor en lokt daarmee een schone, pulserende afgifte van groeihormoon uit. Samen gebruikt verhogen ze groeihormoon en IGF-1 meer dan elk afzonderlijk, en dat is de mechanistische onderbouwing achter de populaire stack.

STUDIE BIJ MENSEN

Ongeveer 2 tot 10 keer het uitgangsniveau

In de hoofdstudie bij mensen (Teichman 2006) steeg groeihormoon na een enkele injectie tot ongeveer 2 tot 10 keer het uitgangsniveau, meer dan 6 dagen; IGF-1 bleef 9 tot 11 dagen verhoogd. Dat zijn bloedwaarden, geen bewezen voordeel. Ze gelden alleen voor de DAC-versie; veel grijze-marktpoeder dat als CJC-1295 wordt verkocht is kortwerkend no-DAC (mod GRF 1-29).

DE EERLIJKE LEEMTE

Niet bewezen, nooit gefinancierd

De eerlijke leemte zit in de uitkomstgegevens bij mensen: sneller herstel, betere prestaties en een slanker lichaam zijn niet bewezen omdat de studies nooit zijn gefinancierd, niet omdat ze zijn uitgevoerd en mislukten. Dat is een leemte in het onderzoeksdossier, geen bevinding tegen het middel.

VEILIGHEID EN MONITORING

Glucose en IGF-1 volgen

De veiligheidsgegevens bij mensen zijn nog beperkt. Aanhoudende stimulatie kan glucose en insulinegevoeligheid beïnvloeden, en er is theoretische zorg over somatotrope hyperplasie of hypofyseadenomen bij langdurige stimulatie. Vandaar toezicht: periodiek glucose en IGF-1 meten. Buiten een goedgekeurde toeleveringsketen is niets gecontroleerd: verontreiniging, onzuiverheid, verkeerde dosis of een ander molecuul in het flesje.

STATUS EN SPORT

Geen goedgekeurd geneesmiddel

Geen van beide is goedgekeurd als geneesmiddel: geen handelsvergunning van de FDA, de EMA of de TGA. Die status verklaart ook de magere uitkomstgegevens: geen sponsor, geen grote studie. In juli 2026 stemde een FDA-adviescommissie positief over zes peptiden; CJC-1295 en ipamoreline niet. Beide staan op de WADA-Verbodsjijst, alleen relevant in getoetste sport.

ONZE ROL



Kennis, geen product

Deze combinatie is populair, maar wij verkopen het niet en schrijven het niet voor. Wat wij bieden is een eerlijk oordeel over wat het bewijs ondersteunt, hoe u productkwaliteit beoordeelt en waar u in uw eigen gezondheid op moet letten, zoals glucose en IGF-1. Dit artikel is educatief en is geen aanbod om deze middelen te leveren.